

## การแพ้ยา คืออะไร

การแพ้ยา คือ ปฏิกิริยาที่ร่างกายตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอม (ในที่นี้คือยาที่ได้รับ) ผ่านระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดยมีความรุนแรงตั้งแต่ระดับรุนแรงน้อยจนถึงระดับที่สามารถเสียชีวิตได้ นอกจากนี้หากมีการเกิดแพ้ยาซ้ำ มักจะมีอาการที่รุนแรงมากกว่าการแพ้ยาก่อนหน้านี้



## อาการของ การแพ้ยา

ระดับรุนแรงน้อย เช่น อาการคัน ผื่นที่ผิวหนัง อาการลมพิษ อาเจียน เยื่อบุอ่อนบวมได้แก่ ตา ริมฝีปาก อวัยวะเพศ

ระดับรุนแรงมาก ได้แก่ ผื่นหนังลอก หายใจลำบาก หอบ ความดันโลหิตลดลง ซึ่งอาการเหล่านี้สามารถทำให้เสียชีวิตได้

หากมีการหยุดยาที่เป็นสาเหตุแพ้ยา อาการผู้ป่วยก็จะกลับมาเป็นปกติ

## ทำอย่างไรเมื่อ สงสัยการแพ้ยา

1. หยุดยาที่คาดว่าเป็นสาเหตุการแพ้ยาทันที
2. นำยาที่สงสัยมาปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพื่อหาสาเหตุการแพ้ยาและแก้ไขอาการแพ้ยา
3. หากมีอาการรุนแรง ให้นำผู้ป่วยส่งพบแพทย์ทันที พร้อมยาที่คาดว่าเป็นสาเหตุการแพ้ยา

| ยาที่สงสัย (ชื่อการค้า)   | อาการไม่พึงประสงค์ | ผลการประเมิน* | หน่วยงาน/ชื่อผู้รายงานว.ป. ที่รายงาน |
|---|--------------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>ตัวอย่างบัตรแพ้ยา</b>  |                    |               |                                      |
| หมายเหตุ *1 = ใช้แน่นอน 2 = น่าจะใช้ 3 = อาจจะใช้ H = ประวัติการแพ้ยา |                    |               |                                      |

## บัตรแพทย์ใช้อย่างไร

1. ให้เจ้าของบัตร หรือผู้ดูแลผู้ป่วยพยายามจดจำยาที่เคยแพ้
2. แสดงบัตรแพทย์ทุกครั้งที่ได้รับบริการทางการแพทย์ หรือซื้อยาที่ร้านขายยา
3. บัตรแพทย์นี้มีประโยชน์ในการป้องกันการแพ้ยาซ้ำ
4. กรณีบัตรแพทย์หาย หรือชำรุด สามารถขอบัตรใหม่ได้ที่โรงพยาบาลเดิม หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน

ติดตามข้อมูล ที่เว็บไซต์

<http://www.kudbakhos.org/drug>

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

กลุ่มงานเภสัชกรรม

โรงพยาบาลกุดบาก

โทรศัพท์ 042-784021

Line @ews2410n



# บัตรแพทย์ สำคัญอย่างไร

## บัตรแพทย์/เตือนเรื่องยา

โปรดแสดงบัตรนี้ทุกครั้งเมื่อรับการตรวจรักษาหรือรับยา

เพื่อตรวจสอบว่าท่านได้รับยาที่อาจเกิดอาการแพ้ตามที่ระบุไว้หรือไม่

ชื่อ-สกุล.....ID No.....

ที่อยู่.....

โรงพยาบาล/สถานพยาบาล.....

แพ้ยาอาจถึงตาย หากมีอาการผิดปกติหรือสงสัยว่าแพ้ยาตัวใด  
ให้หยุดยานั้นทันที และนำตัวอย่างยาดังกล่าวพร้อมซองยา (ถ้ามี)  
ไปปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร