

## Naloxone HCl injection

ชื่อการค้า	NARCOTAN
รูปแบบยา	Ampule: 400 mcg (0.4 mg) / 1 ml
ข้อบ่งใช้	Opioid antidote
การผสมยา	สามารถให้ได้ทั้ง SubQ, IM, และ IV แต่นิยมให้ IV มากที่สุด
ขนาด/การบริหาร	<p><b>ผู้ใหญ่</b> - IV : 0.4 mg (1 amp) – 2 mg (5 amp) IV push มากกว่า 30 วินาที ทุก 2–3 นาที {max 10 mg (25 amp)} หลังจากอาการดีขึ้นอาจให้ยาซ้ำที่ 20 – 60 นาที ขึ้นกับระยะเวลาการออกฤทธิ์ของยาที่ทำให้เกิดพิษ หากให้ยาเกิน 10 mg (25 amp) แล้วไม่มีการตอบสนองอาจเกิดจากสาเหตุอื่น</p> <p>- IV infusion : เจือจางด้วย D5W หรือ NSS 99 mL ต่อยา 1 amp (Conc. 4mcg/mL) ผสมแล้วเก็บได้ 24 hr</p> <p><b>เด็ก</b></p> <p><b>Opiate poisoning :</b> แรกเกิด (รวม premature ด้วย) – 5 ปี หรือ น้ำหนัก &lt; 20 kg : 0.1 mg/kg/dose (max 2 mg) IV push มากกว่า 30 วินาที ซ้ำทุก 2-3 นาที</p> <p>&gt; 5 ปี หรือ ≥ 20 kg : 2 mg/dose IV push มากกว่า 30 วินาที ซ้ำทุก 2-3 นาที</p> <p><b>Post anesthesia narcotic reversal :</b> 0.01 mg/kg/dose IV push มากกว่า 30 วินาที ซ้ำทุก 2-3 นาที</p>
การเก็บรักษา	***ห้ามใช้ยากรณียาเปลี่ยนสีหรือมีตะกอน เก็บที่อุณหภูมิห้อง เก็บให้พ้นแสง
อาการข้างเคียง	คลื่นไส้ อาเจียน ผื่น ความดันโลหิตต่ำ ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นผิดจังหวะ ปวดบวม น้ำ ชัก (ขนาดสูงอาจทำให้เซลล์ตับเกิดความเสียหาย)
การติดตาม	HR, BP, RR, Temperature, Level of consciousness, ABGs or Pulse oximetry
รายงานแพทย์	BP < 90/60 mmHg, RR < 12 /min, Mental status : หลับแล้วปลุกตื่นยาก, ตื่นแล้วไม่ค่อยรู้สึกตัว, ไม่รู้สึกตัว ADR : คลื่นไส้ อาเจียนมาก ผื่นคัน

**\*\*การประเมินผู้ป่วย\*\*ประเมินทุก 2 นาทีหลังให้ยาแต่ละครั้งและหลังจากหยุดยา 60 นาที**