

## Terbutaline injection.

รูปแบบยา	Ampule: 0.5 mg / 1 ml	
ข้อบ่งใช้	ผู้ป่วยทางเดินหายใจอุดกั้นชนิด Reversible หอบหืด	<b>Unlabeled use :</b> Tocolytic Agents (Management of Preterm labor)
ผู้ป่วยตั้งครรภ์	Pregnancy Category: B	
ข้อห้ามใช้	Hypersensitivity to <b>Terbutaline</b> หัวใจเต้นผิดปกติเนื่องจากภาวะ Tachycardia Tachycardia จากการได้รับยา Digitalis เกินขนาด	
ขนาด/การบริหาร	***บริหารยาด้วยการฉีดเข้าใต้ผิวหนังเท่านั้น (โดยมากบริเวณหัวไหล่) ***กรณี IV ควรใช้ เป็นกรณีเฉพาะราย และต้องติดตามอย่างใกล้ชิด  <b>ผู้ใหญ่</b> <b>Premature labor :</b> 2.5-10 mcg/min IV ----> ค่อยๆเพิ่มขนาดยาทุก 10-20 นาที ตามการบีบตัวของมดลูก เป็นเวลาอย่างน้อย 12 ชั่วโมง สามารถให้ยาสูงถึง 17.5-30 mcg/min	
การติดตาม	BP, HR Electrolyte : Serum Potassium, DTX IV site Extravasation ทุกครั้งที่วัด V/S	
การเก็บรักษา	***ห้ามใช้ยากรณียาเปลี่ยนสีหรือมีตะกอน เก็บที่อุณหภูมิ 15 – 30°C ให้พ้นแสง และความชื้น	
อาการข้างเคียง	หงุดหงิด, กระสับกระส่าย, สั่น ระดับ Glucose ในเลือดสูงขึ้น, ระดับ Potassium ในเลือดต่ำลง Tachycardia, Hypertension มึนงง, อ่อนเพลีย, ตะคริว, ปากแห้งคอแห้ง, การรับรสผิดปกติ, N/V	
การแก้ไข อาการพิษ	พิจารณาหยุดยาหรือปรับลดขนาดยา รักษาตามอาการที่เกิดขึ้น หากพบรอยแดง บวม คล้ำตามเส้นเลือดบริเวณ IV site ให้เปลี่ยนตำแหน่งให้ยาใหม่	
รายงานแพทย์	BP > 160/90 mmHg หรือ HR > 120/min (ผู้ใหญ่) BP > 120/80 mmHg หรือ HR > 180/min (เด็ก) Serum K > 5 mEq/ml หรือ < 3.5 mEq/ml DTX > 200 mg/dl	